

栽培履歴書

| | | | | | | |
|------------|------|--------------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| 氏名 | | 長岡市立東谷小学校 | | | | |
| 地域名 | | 学校 | | | | |
| ほ場所在地 | | 長岡市大川戸 | | | | |
| 品種名 | | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月10日 | 栽培方法 | 慣行栽培 | | |
| | は種量 | 120g/箱 | | | | |
| | 田植日 | 5月18日 | 中干し期 | | | 6月20日～6月27日 |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | | | 8月3日 |
| | 栽植密度 | 45株/坪 | 落水期 | | | 8月27日 |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | | | 9月14日 |
| | | 投入資材名 | 成分含量(%) N P K | 投入量(kg) (10a当り) | 投入期日 | |
| 施肥 土づくり | 基肥 | オール14 | 14-14-14 | 10 | 5月10日 | |
| | 穂肥 | 穂肥520号 | 15-2-10 | 70 | 7月20日 | |
| | | 鶏糞 | 3-4-2 | 75 | 5月3日 | |
| | | ようりん・ケイカル14号 | 0-3-0 | 60 | 5月3日 | |
| 乾燥方法 | | 遠赤 | 色選 | 有 | ふるい目 1.9mm | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------------|------------------|--------------------|------------|-------|
| 氏名 | | 頼所 賢太 | | | | |
| 地域名 | | 長岡 | | | | |
| ほ場所在地 | | 長岡市下々条町 | | | | |
| 品種名 | | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | JA購入 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | | |
| | は種量 | | | | | |
| | 田植日 | 5月13日 | 中干し期 | | | |
| | 育苗方法 | | 出穂期 | | | 8月5日 |
| | 栽植密度 | 42株/坪 | 落水期 | | | 8月20日 |
| | ワラ鋤込 | 春鋤込 | 刈取日 | | | 9月14日 |
| | | 投入資材名 | 成分含量(%) N P K | 投入量(kg) (10a当り) | 投入期日 | |
| 施肥 土づくり | 基肥 | アイアンソイルパワー | 0-10-0 | 20 | 4月22日 | |
| | | エコ5-5専用有機入一発肥料 | 11-7-6 | 30 | 4月22日 | |
| | 追肥 | みつパワー | | 20 | 7月14日 | |
| | 穂肥 | 味好2号 | 7-2-7 | 20 | 8月4日 | |
| 乾燥方法 | | 火力 | 色選 | 無 | ふるい目 1.9mm | |

| | | | | | | |
|------------|------|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| 氏名 | | (農)桐沢担い手生産組合 | | | | |
| 地域名 | | 小国 | | | | |
| ほ場所在地 | | 長岡市小国町桐沢 | | | | |
| 品種名 | | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | JA購入 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | | |
| | は種量 | | | | | |
| | 田植日 | 5月15日 | 中干し期 | | | 6月14日～6月23日 |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | | | 8月4日 |
| | 栽植密度 | 60株/坪 | 落水期 | | | 8月25日 |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | | | 9月20日 |
| | | 投入資材名 | 成分含量(%) N P K | 投入量(kg) (10a当り) | 投入期日 | |
| 施肥 土づくり | 基肥 | JA柏崎コシヒカリ一発肥料 | 12-9-7 | 40 | 4月25日 | |
| | | おぐに土づくり肥料 | 0-3.9-0 | | | |
| | 乾燥方法 | 遠赤 | 色選 | 有 | ふるい目 1.9mm | |

| | | | | | | |
|------------|------|--------------|------------------|--------------------|-------------|------------|
| 氏名 | | 大矢 猛雄 | | | | |
| 地域名 | | 和島 | | | | |
| ほ場所在地 | | 長岡市和島中沢 | | | | |
| 品種名 | | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | | |
| | は種量 | | | | | |
| | 田植日 | 5月5日 | 中干し期 | | | 6月11日～7月1日 |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | | | 8月4日 |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | | | 8月19日 |
| | ワラ鋤込 | 春鋤込 | 刈取日 | | | 9月13日 |
| | | 投入資材名 | 成分含量(%) N P K | 投入量(kg) (10a当り) | 投入期日 | |
| 施肥 土づくり | 基肥 | ほたる有機基肥オール10 | 10-10-10 | 28 | 4月12日 | |
| | 穂肥 | ほたる有機穂肥 | 10-4-6 | 10 | 7月16日 | |
| | | ほたる有機穂肥 | 10-4-6 | 10 | 7月24日 | |
| | | 稲わら鋤込 | | | | |
| 乾燥方法 | | 火力 温度 46℃ | 色選 | 無 | ふるい目 1.85mm | |

| | | | | | | |
|------------|------|--------------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| 氏名 | | 箕輪 俊美 | | | | |
| 地域名 | | 栃尾 | | | | |
| ほ場所在地 | | 長岡市小真太田廻 | | | | |
| 品種名 | | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月22日 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | | |
| | は種量 | 130g/箱 | | | | |
| | 田植日 | 5月20日 | 中干し期 | | | 6月13日～7月10日 |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | | | 8月3日 |
| | 栽植密度 | 60株/坪 | 落水期 | | | 8月24日 |
| | ワラ鋤込 | 春鋤込 | 刈取日 | | | 9月11日 |
| | | 投入資材名 | 成分含量(%) N P K | 投入量(kg) (10a当り) | 投入期日 | |
| 施肥 土づくり | 基肥 | ケイ酸入エコ55専用元肥 | 10-6-6 | 30 | 5月20日 | |
| | | マルチサポート1号 | | 20 | 5月20日 | |
| 乾燥方法 | | 遠赤 温度 40℃ | 色選 | 無 | ふるい目 1.9mm | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| 氏名 | | 石橋 繁男 | | | | |
| 地域名 | | 長岡 | | | | |
| ほ場所在地 | | 長岡市深沢町 | | | | |
| 品種名 | | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 5月10日 | 栽培方法 | 慣行栽培 | | |
| | は種量 | 140g/箱 | | | | |
| | 田植日 | 5月26日 | 中干し期 | | | 6月15日～6月23日 |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | | | 8月12日 |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | | | 9月5日 |
| | ワラ鋤込 | 春鋤込 | 刈取日 | | | 9月21日 |
| | | 投入資材名 | 成分含量(%) N P K | 投入量(kg) (10a当り) | 投入期日 | |
| 施肥 土づくり | 基肥 | 味好2号 | 7-2-7 | 10 | 5月19日 | |
| | 追肥 | スパーシリカ | | 20 | 6月24日 | |
| | | マルチサポート1号 | | 20 | 6月24日 | |
| 乾燥方法 | | 火力 | 色選 | 有 | ふるい目 1.9mm | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| 氏名 | | 小原 周市 | | | | |
| 地域名 | | 長岡 | | | | |
| ほ場所在地 | | 長岡市下々条町畑田 | | | | |
| 品種名 | | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月7日 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | | |
| | は種量 | 170g/箱 | | | | |
| | 田植日 | 5月1日 | 中干し期 | | | 6月12日～6月25日 |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | | | 7月31日 |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | | | 8月25日 |
| | ワラ鋤込 | 春鋤込 | 刈取日 | | | 9月12日 |
| | | 投入資材名 | 成分含量(%) N P K | 投入量(kg) (10a当り) | 投入期日 | |
| 施肥 土づくり | 基肥 | ブラドミンR-La | 7-3-2 | 45 | 3月30日 | |
| | 穂肥 | マルチサポート1号 | | 20 | 7月16日 | |
| | | ハイグリーン | | 20 | 7月21日 | |
| 乾燥方法 | | 遠赤 温度 50℃ | 色選 | 有 | ふるい目 1.9mm | |

| | | | | | | |
|------------|------|--------------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| 氏名 | | 山田 秀男 | | | | |
| 地域名 | | 川口 | | | | |
| ほ場所在地 | | 長岡市西川口 | | | | |
| 品種名 | | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | JA購入 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | | |
| | は種量 | | | | | |
| | 田植日 | 5月11日 | 中干し期 | | | 6月10日～6月30日 |
| | 育苗方法 | 成苗 | 出穂期 | | | 8月3日 |
| | 栽植密度 | 60株/坪 | 落水期 | | | 8月23日 |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | | | 9月7日 |
| | | 投入資材名 | 成分含量(%) N P K | 投入量(kg) (10a当り) | 投入期日 | |
| 施肥 土づくり | 基肥 | 越後の輝き有機50 | 10-13-10 | 50 | 5月11日 | |
| | 追肥 | グルメエース | 0-6-0 | 30～40 | 6月27日 | |
| | 穂肥 | 味好2号 | 7-2-7 | 5～10 | 7月21日 | |
| | | 魚沼ロマンアイアンスター | 0-8-0 | 40 | H29.9月17日 | |
| 乾燥方法 | | 火力 温度 34～48℃ | 色選 | 有 | ふるい目 1.9mm | |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|--------------|-------|
| 氏名 | 田中 正平 | | | | |
| 地域名 | 中之島 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市池之島 | | | | |
| 品種名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月13日 | 栽培方法 | 特別栽培(3割以上低減) | |
| | は種量 | 180g/箱 | | | |
| | 田植日 | 5月5日 | 中干し期 | 6月20日～7月5日 | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月3日 | |
| | 栽植密度 | 60株/坪 | 落水期 | 8月25日 | |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | 9月12日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N P K | | (10a当り) | | |
| | | | | | |
| 施肥 | 基肥 | なんかん穂垂配合 | 12-12-12 | 20 | 4月15日 |
| | 穂肥 | 穂肥500号 | 15-0-10 | 10 | 7月25日 |
| | 土づくり | もみ殻 | | 100 | |
| 乾燥方法 | 遠赤 温度 45℃ | 色選 | 無 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 氏名 | 佐藤 達典 | | | | |
| 地域名 | 栃尾 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市吉水 | | | | |
| 品種名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | |
| | は種量 | | | | |
| | 田植日 | 5月12日 | 中干し期 | 6月13日～6月30日 | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月3日 | |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | 8月20日 | |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | 9月6日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N P K | | (10a当り) | | |
| | | | | | |
| 施肥 | 基肥 | アグリおからスーパー有機 | 4.8-3.5-2.2 | 45 | 4月30日 |
| | | エコ5-5専用元肥 | 10-6-2 | 30 | 5月12日 |
| | 追肥 | ケイ酸加里プレミア | 0-0-20 | 30 | 6月23日 |
| | | ケイ酸加里プレミア | 0-0-20 | 30 | 7月3日 |
| 土づくり | 粒状ようりんケイカル14号 | 0-3-0 | | 平成29年10月1日 | |
| 乾燥方法 | 遠赤 温度 50℃ | 色選 | 無 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|-------------|-------|
| 氏名 | 清水 治 | | | | |
| 地域名 | 長岡 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市高見町 | | | | |
| 品種名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月3日 | 栽培方法 | 慣行栽培 | |
| | は種量 | 185g/箱 | | | |
| | 田植日 | 5月1日 | 中干し期 | 6月18日～7月15日 | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月3日 | |
| | 栽植密度 | 37株/坪 | 落水期 | 8月25日 | |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | 9月12日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N P K | | (10a当り) | | |
| | | | | | |
| 施肥 | 基肥 | いせき化成484 | 14-28-14 | 20 | 4月26日 |
| | | ファイトアップ | | 半袋5錠 | 5月11日 |
| | 追肥 | スーパーマグ | | 30 | 6月23日 |
| | | ファイトアップ | | 1袋10錠 | 6月30日 |
| 穂肥 | 追肥NK化成525 | 15-2-15 | 7 | 7月14日 | |
| | 追肥NK化成525 | 15-2-15 | 6 | 7月24日 | |
| 乾燥方法 | 火力 温度 42℃ | 色選 | 無 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------|--------------|-------------|
| 氏名 | 奈良場 正一 | | | | |
| 地域名 | 三島 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市鳥越 | | | | |
| 品種名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月11日 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | |
| | は種量 | 150g/箱 | | | |
| | 田植日 | 5月6日 | 中干し期 | 6月15日～6月25日 | |
| | 育苗方法 | 成苗 | 出穂期 | 8月2日 | |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | 9月1日 | |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | 9月11日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N P K | | (10a当り) | | |
| | | | | | |
| 施肥 | 基肥 | 越後の輝き有機50元肥エコ | 10-8-8 | 20 | 4月16日 |
| | | 塩化加里60 | 0-0-60 | 10 | 6月22日 |
| | 追肥 | 苦土重焼燐 | 0-35-0 | 10 | 6月22日 |
| | | ほたる有機穂肥 | 10-4-6 | 20 | 7月18日、7月22日 |
| | 土づくり | 鶏ちゃんパワー特ベレット | 4-3-2 | 30 | 29.10月16日 |
| 乾燥方法 | 火力 温度 40℃ | 色選 | 無 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|------------------|-----------|---------|--------------|-------|
| 氏名 | 農事組合法人 森光担い手生産組合 | | | | |
| 地域名 | 小国 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市小国町森光 | | | | |
| 品種名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | JA購入 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | |
| | は種量 | | | | |
| | 田植日 | 5月15日 | 中干し期 | | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | | |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | | |
| | ワラ鋤込 | | 刈取日 | | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N P K | | (10a当り) | | |
| | | | | | |
| 施肥 | 基肥 | こしひかり一発肥料 | 30 | 5月15日 | |
| | 穂肥 | 穂肥520 | 10 | 7月20日 | |
| 乾燥方法 | 火力 温度 40℃ | 色選 | 有 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-----------|
| 氏名 | 農事組合法人 なかさとみなみ | | | | |
| 地域名 | 小国 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市相野原 | | | | |
| 品種名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | |
| | は種量 | | | | |
| | 田植日 | 5月15日 | 中干し期 | 6月21日～7月5日 | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月4日 | |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | 8月25日 | |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | 9月17日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N P K | | (10a当り) | | |
| | | | | | |
| 施肥 | 基肥 | JA柏崎コシヒカリ一発肥料 | 12-9-7 | 32 | 5月15日 |
| | | 越後のかがやき | 12-2-8 | 7 | 7月21日 |
| | 穂肥 | 越後のかがやき | 12-2-8 | 7 | 7月29日 |
| | | おぐに土づくり肥料 | 0-3.9-0 | 30 | H29.10月9日 |
| 乾燥方法 | 遠赤 温度 37℃ | 色選 | 有 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|----------|------------|-------|
| 氏名 | 佐藤 徹 | | | | |
| 地域名 | 栃尾 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市一之貝 | | | | |
| 品種名 | コシヒカリ | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月18日 | 栽培方法 | 慣行栽培 | |
| | は種量 | 160g/箱 | | | |
| | 田植日 | 5月16日 | 中干し期 | 6月20日～7月5日 | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月15日 | |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | | |
| | ワラ鋤込 | 春鋤込 | 刈取日 | 9月28日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N P K | | (10a当り) | | |
| | | | | | |
| 施肥 | 基肥 | BBO50 | 10-15-10 | 30 | 5月5日 |
| | 追肥 | BBO50 | 10-15-10 | 10 | 6月10日 |
| | 穂肥 | 穂肥520号 | 15-2-10 | 15 | 7月25日 |
| 乾燥方法 | 火力 温度 40℃ | 色選 | 無 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|--------------|--------|
| 氏名 | 佐藤 孝文 | | | | |
| 地域名 | 長岡 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市西片貝町 | | | | |
| 品種名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月23日 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | |
| | は種量 | 150g/箱 | | | |
| | 田植日 | 5月28日 | 中干し期 | 6月20日～7月20日 | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月8日 | |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | 9月2日 | |
| | ワラ鋤込 | 春鋤込 | 刈取日 | 9月28日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N P K | | (10a当り) | | |
| | | | | | |
| 施肥 | 基肥 | ケイ酸入エコ5-5専用元肥 | 10-6-6 | 18 | 5月28日 |
| | 土づくり | もみ殻 | | 1200 | H29.秋 |
| 乾燥方法 | 火力 送風 | 色選 | 有 | ふるい目 | 1.95mm |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| 氏名 | 茨木 智昭 | | | | |
| 地域名 | 栃尾 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市軽井沢 | | | | |
| 品 種 名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | | 栽培方法 | 慣行栽培 | |
| | は種量 | | | | |
| | 田植日 | 5月11日 | 中干し期 | 6月18日～7月10日 | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月11日 | |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | 8月16日 | |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | 9月23日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N | P | K | (10a当り) | |
| 施肥 | 基肥 | エコ5-5専用元肥 | 10-6-6 | 30 | 5月11日 |
| | 追肥 | 元肥BB500号 | 15-10-10 | 8 | 6月17日 |
| | | スーパーシリカプレミアム | | 20 | 6月29日 |
| | 土づくり | ケイカル | | 60 | 29.10.15日 |
| 乾燥方法 | 遠赤 温度 50℃ | 色選 | 有 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------|--------------|-------------|
| 氏名 | 奈良場 正一 | | | | |
| 地域名 | 三島 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市鳥越西 | | | | |
| 品 種 名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月11日 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | |
| | は種量 | 150g/箱 | | | |
| | 田植日 | 5月6日 | 中干し期 | 6月15日～6月25日 | |
| | 育苗方法 | 成苗 | 出穂期 | 8月2日 | |
| | 栽植密度 | 50株/坪 | 落水期 | 9月1日 | |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | 9月13日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N | P | K | (10a当り) | |
| 施肥 | 基肥 | 越後の輝き有機50元肥エコ | 10-8-8 | 20 | 4月17日 |
| | 追肥 | 塩化加里60 | 0-0-60 | 10 | 6月22日 |
| | | 苦土重焼燐 | 0-35-0 | 10 | 6月22日 |
| | 穂肥 | ほたる有機穂肥 | 10-4-6 | 20 | 7月18日、7月23日 |
| | 土づくり | 鶏ちゃんパワー特ベレット | 4-3-2 | 30 | 29.10.11日 |
| 乾燥方法 | 火力 温度 40℃ | 色選 | 無 | ふるい目 | 1.9mm |

| | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|--------------|-------|
| 氏名 | 木村 晃 | | | | |
| 地域名 | 長岡 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市中沢町荻原 | | | | |
| 品 種 名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 5月6日 | 栽培方法 | 特別栽培(5割以上低減) | |
| | は種量 | 145g/箱 | | | |
| | 田植日 | 5月26日 | 中干し期 | 6月27日～7月2日 | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月12日 | |
| | 栽植密度 | 60株/坪 | 落水期 | 9月8日 | |
| | ワラ鋤込 | 春鋤込 | 刈取日 | 9月23日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N | P | K | (10a当り) | |
| 施肥 | 基肥 | エコ専用肥料 | 10-6-6 | 10 | 5月20日 |
| | 追肥 | 牛フン | | 10袋 | 4月25日 |
| | | ケイ酸加里プレミアム34 | | 20 | 6月29日 |
| | | ケイ酸加里プレミアム34 | | 40 | 7月3日 |
| | | ウォーターシリカ | | 15 | 7月18日 |
| | | マルチサポート | | 40 | 7月28日 |
| | 土づくり | アイアンソイルパワー | | 20 | 5月20日 |
| 乾燥方法 | 天日 | 色選 | 有 | ふるい目 | 2.0mm |

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| 氏名 | 三浦 昇五 | | | | |
| 地域名 | 長岡 | | | | |
| ほ場所在地 | 長岡市小曾根町 | | | | |
| 品 種 名 | コシヒカリBL | | | | |
| 栽培概要 | は種日 | 4月14日 | 栽培方法 | その他(無農薬・無化学肥料) | |
| | は種量 | 80g/箱 | | | |
| | 田植日 | 5月23日 | 中干し期 | 7月20日～ | |
| | 育苗方法 | 稚苗 | 出穂期 | 8月6日 | |
| | 栽植密度 | 60株/坪 | 落水期 | 8月30日 | |
| | ワラ鋤込 | 秋鋤込 | 刈取日 | 9月17日 | |
| 投入資材名 | 成分含量(%) | | 投入量(kg) | 投入期日 | |
| | N | P | K | (10a当り) | |
| 施肥 | 基肥 | ボカシ大王S | 6.3-4.1-2.7 | 15 | 5月11日 |
| | 追肥 | サカナエキス特ベレ | 7.5-4.3-0.6 | 15 | 5月23日 |
| | | ボカシ大王S | 6.3-4.1-2.7 | 5 | 8月2日 |
| | | サカナエキス特ベレ | 7.5-4.3-0.6 | 5 | 8月2日 |
| | 土づくり | ボカシコンプ(粉) | 0.67-1-0.23 | 30L | 5月11日 |
| | その他 | 米糠 | 2-0-0 | 45 | 5月11日 |
| | | 金之助ミネラル | 0-0-0 | 3L | 平成29年10月30日 |
| | | ケルバック66(液) | 0-0-0 | 4ml | 4月27日 |
| ケルバック66(粒状) | | 0-0-0 | 2.4 | 5月22日、7月6日 | |
| 乾燥方法 | 火力 温度 28～32℃ | 色選 | 有 | ふるい目 | 1.9mm |